

Zur Kenntniss des Fluorens und Acenaphtens.

Inaugural-Dissertation

zur Erlangung der Doktorwürde

vorgelegt der

Naturwissenschaftlich - Mathematischen Fakultät

der

Albert-Ludwigs-Universität

zu

Freiburg im Breisgau

von

Kurt Schwandt

aus

Berlin.



Freiburg i. Br.

Speyer & Kaerner, Universitätsbuchhandlung.

1912.

Dekan:

Geh. Hofrat Prof. Dr. Stickelberger.

Referent:

Professor Dr. Gattermann.

Meinen Eltern!



Digitized by the Internet Archive
in 2026

Zur Kenntnis des Fluorens.

Theoretischer Teil.

In den letzten beiden Jahrzehnten ist das Fluoren nebst seinen Abkömmlingen von zahlreichen Forschern näher untersucht worden, doch erstreckten sich die Studien mit diesem Stoffe wesentlich auf die Gewinnung der Halogen-, Nitro- und Amidoderivate sowie der Karbonsäure¹. Kernsubstituierte Schwefelverbindungen und besonders Merkaptane des Fluorens waren bislang noch nicht dargestellt worden, mit Ausnahme eines von Smedley beschriebenen Disulfides², das bei Versuchen über den Zusammenhang zwischen Konstitution und Farbe bei Fluorenderivaten erhalten wurde.

Da es Lenhard und Klauss³ mit Hilfe der von Knoevenagel⁴ verbesserten Friedel-Crafts'schen Reaktion gelang, das Acenaphten, einen bisher noch weniger untersuchten und besonders einfachen Reaktionen schwer zugänglichen Kohlenwasserstoff, leicht über seine Sulfinsäure in das Merkaptan überzuführen,

¹ B. 17, 107. 34, 1759. 40, 4258. 41, 1243.

² C. 1905, 2, 1344.

³ Klauss, Dissert. Freiburg 1910.

⁴ B. 41, 3315.

so wurde mir die Aufgabe gestellt, auch das Fluoren der vorerwähnten Reaktion zu unterwerfen und Versuche zur Gewinnung des bisher unbekannten Merkap-
tans anzustellen.

Friedel und Crafts¹ hatten beobachtet, dass das Anhydrid der schwefligen Säure, analog dem der Kohlensäure, mit aromatischen Kohlenwasserstoffen in Gegenwart von Aluminiumchlorid unter Bildung von Sulfinsäuren reagiert. Da die Ausbeuten jedoch sehr zu wünschen übrig liessen, fand das Verfahren weder wissenschaftlich noch technisch Verwertung. Knoevenagel hat die Versuche der beiden Forscher im Jahre 1908 wieder aufgenommen, und es gelang ihm, durch Anwendung tiefer Temperaturen während des Reaktionsvorganges und durch Zerlegung der in erster Reaktionsphase gebildeten Aluminiumchloridsalze der Sulfinsäuren mit Alkalien, an Stelle der von Friedel-Crafts verwandten Säuren, die Ausbeute an Sulfinsäure so wesentlich zu verbessern, dass das Verfahren mit gutem Erfolge in Wissenschaft und Technik nunmehr Verwertung finden kann.

Nach Knoevenagels Auffassung vollzieht sich die Reaktion im Sinne folgender Gleichungen:

1. $\text{AlCl}_3 + \text{SO}_2 = \text{Cl} \cdot \text{SO}_2 \cdot \text{AlCl}_2,$
2. $\text{R} \cdot \text{H} + \text{Cl} \cdot \text{SO}_2 \cdot \text{AlCl}_2 = \text{R} \cdot \text{SO}_2 \cdot \text{AlCl}_2 + \text{HCl},$
3. $\text{R} \cdot \text{SO}_2 \cdot \text{AlCl}_2 + 3 \text{NaOH} = \text{R} \cdot \text{SO}_2 \text{Na} + 2 \text{NaCl} + \text{Al}(\text{OH})_3.$

Da die Sulfinsäuren unter geeigneten Bedingungen durch nascierenden Wasserstoff leicht in Mercaptane überzuführen sind:




so ist das von Knoevenagel verbesserte Verfahren auch vorteilhaft zur Darstellung von Mercaptanen zu verwerten.

¹ A. ch. (6) 14, 443.

Wie die Praxis gelehrt hat, werden die Ausbeuten an Sulfinsäure vielfach dadurch beeinträchtigt, dass beim Einleiten von schwefliger Säure schon nach kurzer Zeit eine Verharzung der Reaktionsmasse eintritt, die ein ferneres Einwirken des dauernd weiter zugeführten Gases verhindert. Um diesem Übelstande zu begegnen, hat Lenhard einen Apparat konstruiert, welcher gestattet, während des Einleitens des Gases das Reaktionsgemisch dauernd in Bewegung zu halten, um einer Verharzung vorzubeugen.

Mit Hilfe dieses Apparates ist es mir gelungen, auch das Fluoren zunächst in das Natriumsalz seiner Sulfinsäure überzuführen und durch Ansäuern daraus die reine Sulfinsäure in guter Ausbeute zu gewinnen.

Zur Charakterisierung dieses Stoffes versuchte ich die Sulfone darzustellen, die nach der Gleichung:



sich bilden. Während mir die Gewinnung des Methylsulfons durch mehrstündiges Kochen einer Suspension des Natriumsalzes in Alkohol mit Jodmethyl ohne Schwierigkeiten gelang, versagten die Versuche, auf gleiche Weise auch das Äthyl- und Benzylsulfon darzustellen. Durch Kochen am Rückflusskühler konnte selbst nach tagelanger Einwirkung eine Umsetzung nicht erzielt werden. Nach mehreren Versuchen gelang es mir schliesslich, das Benzylsulfon durch Erhitzen der verschiedenen Komponenten im Druckrohr zu erhalten, während ich das Äthylsulfon auch auf diese Weise nicht zu gewinnen vermochte.

Das Fluorenmerkaptan stellte ich in sehr guter, fast theoretischer Ausbeute durch Reduktion der Sulfinsäure mit Zinkstaub und Schwefelsäure her. Es ist im Gegensatz zu vielen anderen Merkaptanen in trockenem Zustande ziemlich beständig und konnte daher auch der Analyse unterworfen werden.

Durch Oxydation der alkalischen Mercaptidlösung mit Ferricyankalium oder dem Sauerstoff der Luft wird das Disulfid erhalten, das mit dem in der Literatur beschriebenen ¹ nicht identisch ist.

Die Behandlung des Natriummercaptids mit Jodmethyl, Jodäthyl, Benzylchlorid und Benzoylchlorid lieferte mir in guter Ausbeute die entsprechenden Thioäther und Ester. Auch s-Dichloräthylen liess sich mit Fluorenmercaptid leicht unter Bildung von Fluorendithioacetylenäther umsetzen.

Vom Thioäthyläther konnte ich durch Oxydation mit Wasserstoffsuperoxyd zum Sulfoxyd und durch weitere Oxydation mit Kaliumpermanganat zu dem auf andere Weise nicht zu gewinnenden Sulfon des Fluorenthioäthyläthers gelangen.

Oxalylchlorid wirkt auf das Mercaptan unter Bildung eines Oxalyl difluorenylmercaptans ein, wenn man beide in absolut ätherischer Lösung in der Kälte zusammenbringt.

Nachdem mir die Gewinnung des Fluorenmercaptans, das ich durch mehrere Derivate gekennzeichnet habe, und mit ihr die Lösung meiner Aufgabe gelungen war, musste noch der Konstitutionsbeweis für das neue Mercaptan geführt werden. Um ihn erbringen zu können, liess ich mich von folgender Erwägung leiten:

Es war anzunehmen, dass der saure Sulfinsäurerest dieselbe Stellung im Fluorenmolekül aufsuchen würde, wie die Nitrogruppe.

Von Strassburger ² ist nachgewiesen worden, dass im Mononitrofluoren die Nitrogruppe in 2-Stellung zur Methylengruppe oder in p-Stellung zur Diphenylbindung eingetreten ist.


Es ist mir nun gelungen, nach dem Verfahren von Diels ³ dieses Nitrofluoren in seine Amidoverbindung

¹ loc. cit.

² B. 17, 107.

³ B. 34, 1759.

und diese nach der Methode von Gattermann¹ mittels schwefliger Säure in Gegenwart von Kupferpaste in die 2-Fluorensulfinsäure überzuführen. Die Verbindung erwies sich nach Kristallform und Schmelzpunkt als völlig identisch mit der nach dem Verfahren von Knoevenagel gewonnenen Sulfinsäure, welche somit als 2-Fluorensulfinsäure angesprochen werden muss. Das aus ihr gewonnene Merkaptan muss daher folgende Konstitutionsformel haben:




Tabellarische Übersicht über die aus Fluoren neu gewonnenen Stoffe.

1. 2-Fluorensulfinsäure unter Zersetzung	F. P. 150–160°
2. Silbersalz der Sulfinsäure.	
3. Natriumsalz der Sulfinsäure.	
4. 2-Fluorenmethylsulfon	F. P. 154°.
5. 2-Fluorenbenzylsulfon	F. P. 202°.
6. 2-Fluorenmerkaptan	F. P. 143°.
7. 2-Fluorendisulfid	F. P. 175°.
8. 2-Fluorenthiomethyläther	F. P. 138°.
9. 2-Fluorenthioäthyläther	F. P. 84°.
10. 2-Fluorenthiobenzyläther	F. P. 141,5°.
11. 2-Fluorendithioacetylenäther	F. P. 217°.
12. 2-Fluorenäthylsulfoxyd	F. P. 119,5°.
13. 2-Fluorenäthylsulfon	F. P. 196°.
14. 2-Fluorenthiobenzoyl ester	F. P. 175°.
15. Oxalyldifluorenylmerkaptan	F. P. 295°.

¹ B. 32, 1139.

Experimenteller Teil.

2-Fluorensulfinsäure.




Zur Darstellung der Sulfinsäure nach der Methode von Knoevenagel wurde folgender, von Lenhard konstruierter, Apparat verwendet (Fig. 1):

Ein etwa 8 cm weites und 12 cm hohes, dickwandiges, zylindrisches Glasgefäß (1) wird durch einen dreifach durchbohrten Deckel (2) verschlossen. Von den beiden seitlichen Durchbohrungen dient die eine (3) zum Ableiten der Gase, die andere (4) ermöglicht ein Zugeben von Reagenzien während des Betriebes. Durch die mittlere Durchbohrung (5) führt ein 5—7 mm weites Glasrohr (6), das fast bis auf den Boden des Cylinders reicht, aber für den in das Rohr (6) genau passenden Glasrührer (7) noch genügend Spielraum lässt. Zur Zuführung der Gase dient ein an einer Erweiterung des Rohres (6) angeschmolzenes seitliches Rohr (8). Die Kombination von Rohr und Rührer wird oben durch einen Quecksilberverschluss verschlossen, dessen Konstruktion aus der Zeichnung (Fig. 2) ersichtlich wird.

In diesen Apparat bringt man eine Auflösung von 20 g reinem Fluoren in 80 cem Schwefelkohlenstoff und setzt 20 g fein pulverisiertes Aluminiumchlorid hinzu. In dieses Gemisch wird unter stetigem Umrühren und Kühlen mit Kältemischung eine Stunde lang trockenes Salzsäuregas, und dann während sechs Stunden schweflige Säure eingeleitet. Man lässt das Reaktionsgemisch bei Zimmertemperatur stehen. Die spröde, dunkelgrün gefärbte Masse wird hierauf in einer Reibschale fein zerrieben und auf 500 g saubere Eisstückchen gebracht. Sobald fast alles Eis zergangen ist, macht man mit Natronlauge alkalisch, bringt das Gemenge in einen geräumigen Rundkolben und treibt durch Wasserdampf den Rest des Schwefelkohlenstoffs ab, wobei man darauf achten muss, dass die Flüssigkeit alkalische Reaktion behält. Man erwärmt noch einige Stunden auf dem Wasserbade und filtriert dann von der abgeschiedenen Tonerde ab. In die heisse, klare Flüssigkeit wird zur völligen Entfernung der in Lösung gehaltenen Tonerde mehrere Stunden lang Kohlensäure eingeleitet. Nach abermaligem Filtrieren wird das Filtrat bis zur beginnenden Kristallisation eingedampft. Nach dem völligen Erkalten hat sich das sulfinsaure Natrium in Form glänzender Blättchen abgeschieden. Das so erhaltene Natriumsalz ist fast rein.

Um aus dem Natriumsalz die freie Säure zu gewinnen, löst man es in heissem Wasser, filtriert von



Ungelöstem ab und säuert das noch warme Filtrat mit verdünnter Schwefelsäure an. Die Säure scheidet sich hierbei kristallinisch in Form von spitzen Blättchen ab. Man filtriert ab, wäscht mit heissem Wasser nach und kristallisiert aus sehr verdünntem Alkohol um. Es werden so farblose Blättchen erhalten, die zwischen 155° und 160° unter Zersetzung schmelzen.


Die freie Sulfinsäure ist nicht sehr beständig und zersetzt sich allmählich unter Braunfärbung. Sie ist löslich in Alkohol, Aceton und viel heissem Wasser, schwer löslich jedoch in Äther.

Analyse:

1. 0,1342 g Subst. ergaben 0,1386 g BaSO₄
2. 0,0598 g Subst. ergaben 0,0614 g BaSO₄.

Berechnet:

Gefunden:




S = 13,93 %

1. S = 14,18 %

2. S = 14,10 %

Silbersalz der Fluorensulfinsäure.



Das Silbersalz der Säure wird erhalten, wenn man die alkoholische Auflösung der Säure mit einer alkoholischen Silbernitratlösung versetzt. Das sich sofort abscheidende Silbersalz ist vollkommen farblos, zersetzt sich jedoch schon nach kurzer Zeit am Lichte unter Silberabscheidung, weshalb es der Analyse nicht unterworfen werden konnte.

2-FluorenmethyIsulfon.



5 g Fluorensulfinsäure werden in absolutem Alkohol gelöst und mit der berechneten Menge Natriumalkoholat versetzt. Hierbei scheidet sich das in absolutem Alkohol schwer lösliche Natriumsalz aus. Man fügt hierauf etwas mehr als die berechnete Menge Jodmethyl zu und erhitzt das Gemisch während acht Stunden am Rückflusskühler zum lebhaften Sieden. Aus der erkaltenden, heiss filtrierten Lösung scheidet sich eine reichliche Menge FluorenmethyIsulfon ab, das, aus Alkohol umkristallisiert, in gut ausgebildeten, schwach gelblich gefärbten Blättern erhalten wird, die bei 154° schmelzen. Aus der Mutterlauge lässt sich durch Versetzen mit Wasser noch ein weiterer Anteil dieses Stoffes gewinnen.

Anal y se:

1. 0,1843 g ergaben 0,1776 g BaSO₄
2. 0,1689 g ergaben 0,1630 g BaSO₄

Berechnet:

Gefunden:



S = 13,13 %

1. S = 13,24 %

2. S = 13,25 %.

2-Fluorenbenzylsulfon.

H₂

C



Analog der Darstellungsweise des Fluorenmethylsulfons versuchte ich durch Kochen einer absolut-alkoholischen Suspension des fluorensulfinsauren Natriums mit Benzylchlorid das entsprechende Benzylsulfon zu gewinnen, was mir jedoch, selbst nach mehrtägigem, lebhaften Erhitzen am Rückflusskühler, nicht gelang.

Um dieses Stoffes dennoch habhaft zu werden, schloss ich sulfinsaures Natrium mit der berechneten Menge Benzylchlorid und etwas absolutem Alkohol in eine Bombe ein und erhitzte fünf Stunden lang auf 120°. Nach dem Öffnen der Bombe ergab sich, dass nur eine teilweise Umsetzung stattgefunden hatte. Ich stellte daher den Versuch von neuem an, steigerte aber die Temperatur auf 150° und erhitzte 12 Stunden lang. Nunmehr war die gewünschte Umsetzung fast quantitativ eingetreten. Das Reaktionsprodukt verbrachte ich in eine Schale und dampfte, um Alkohol und Benzylchlorid zu verjagen, zur Trockene. Den Rückstand kochte ich mit Wasser aus, um etwa noch unangegriffenes Natriumsalz zu entfernen. Der Rückstand bestand nunmehr aus reinem Benzylsulfon, das ich aus Chloroform umkristallisierte, in welchem es gut löslich ist. Bei freiwilligem Verdunsten des Lösungsmittels wird das Sulfon in breiten, schwach gelb gefärbten Blättchen gewonnen, die bei 202° schmelzen.

Analyse:

0,0898 g Substanz ergaben 0,0645 g BaSO₄

Berechnet:

Gefunden:



S = 10,01 %

S = 9,86 %.

und erleidet auch in trockenem Zustande nur langsam eine Oxydation zum Disulfide. Rascher vollzieht sich diese Umwandlung in alkalischer, alkoholischer Lösung. Das Merkaptan bildet charakteristisch gefärbte Metallsalze; so wurde ein weisses Silbersalz, ein grünes Kupfersalz und ein gelbliches Bleisalz erhalten. Auf die Haut gebracht, ruft es einen Ausschlag hervor, der wegen seines starken Juckreizes sehr unangenehm empfunden wird.

Analyse:

0,1123 g Subst. ergaben 0,1331 g BaSO_4

Berechnet:

Gefunden:

(C₁₃H₁₀S -- 198,15)

$$S = 16,27 \%$$
$$S = 16,19\%.$$

2-Fluorendisulfid.



Das Disulfid erhält man aus dem Merkaptan am besten durch Oxydation mittels Ferricyankalium. Zu diesem Zwecke löst man das Merkaptan in heissem, verdünntem Alkohol, macht alkalisch und setzt zu der heissen Flüssigkeit einen Überschuss an wässriger Ferricyankaliumlösung. Hierauf verdünnt man mit viel heissem Wasser, kocht auf und filtriert noch heiss ab. Der auf dem Filter verbleibende gelbe Rückstand besteht grösstentheils aus Disulfid, doch haftet demselben Ferricyankalium so fest an, dass es von letzterem nur sehr schwer völlig zu befreien ist. Da eine Reinigung durch Kristallisation hier versagte, versuchte ich durch den Sauerstoff der Luft die Oxydation der Natriummerkaptid-

lösung herbeizuführen und damit die störende Beimengung von Blutlaugensalz zu vermeiden.

Zu diesem Zwecke wurde durch die klare alkalisch-alkoholische Lösung des Merkaptides zwei Tage lang ein Luftstrom hindurchgesogen. Das Disulfid schied sich hierbei in kleinen weissen Nadelchen ab, die mit heissem Wasser sorgfältig gewaschen wurden. Der so gewonnene Stoff schmilzt bei 175° und ist leicht löslich in Chloroform, sowie in Benzol, Xylol und heissem Aceton, unlöslich dagegen in Alkohol und Äther.


Analyse:

1. 0,1026 g Subst. ergaben 0,1183 g BaSO_4 .

2. 0,1155 g Subst. ergaben 0,1344 g BaSO_4 .

Berechnet:

Gefunden:




S = 16,27 %

1. S = 15,83 %

2. S = 15,98 %.

2-Fluorenthiomethyläther.



5 g Merkaptan werden in absolutem Alkohol suspendiert, mit 0,6 g metallischem Natrium versetzt und nach der Auflösung desselben am Rückflusskühler erhitzt. Zu der siedenden Lösung gibt man die berechnete Menge Jodmethyl durch den Kühler und spült mit etwas Alkohol nach. Nach einstündigem Kochen filtriert man vom ausgeschiedenen Natriumjodid ab, versetzt mit heissem Wasser bis zur Trübung und lässt auskristallisieren. Der Methyläther bildet breite, farblose Blättchen, die bei 138° schmelzen und in fast allen organischen Solventien leicht löslich sind. Seine Auflösung in kon-

Zur Darstellung dieses Äthers erhitzt man in absolutem Alkohol aufgeschlämmtes Natriummercaptid kurze Zeit auf dem Wasserbade mit Benzylchlorid. Die schon in der Kälte einsetzende Reaktion ist nach kurzer Zeit beendet. Man filtriert vom Kochsalz und dem im Reaktionsverlauf mitgebildeten Disulfid ab und lässt das Filtrat zur Kristallisation des Äthers erkalten. Die abgeschiedenen, farblosen Kristallnadeln werden mehrmals aus Alkohol umkristallisiert und schmelzen dann scharf bei $141,5^{\circ}$. In noch kürzerer Zeit und in sofort reiner Beschaffenheit gewinnt man den Thiobenzyläther, wenn man Benzylchlorid auf das 2-Fluorensilbermercaptid einwirken lässt. Der reine Äther löst sich leicht auch in Chloroform und Aceton auf.

Analyse:

0,1452 g Subst. ergaben 0,1145 g BaSO_4

Berechnet: Gefunden:

$(\text{C}_{20}\text{H}_{16}\text{S} = 288,20)$

S = 11,13 %

S = 10,83 %.

2-Fluorendithioacetylenäther.

H_2
C

H_2
C


> SCH=CHS

Zur Gewinnung dieses Stoffes wird Natriummercaptid in verdünntem Alkohol gelöst und am Rückflusskühler drei Stunden lang mit der berechneten Menge s-Dichloräthylen erhitzt. Die anfangs klare Lösung trübt sich allmählich und der in Alkohol unlösliche Äther scheidet sich ab. Nach dem Abfiltrieren und Trocknen wird aus Chloroform umkristallisiert. Man erhält so gut ausgebildete, farblose Nadeln, die scharf bei 217° schmelzen und in Aceton schwer, in Alkohol unlöslich sind.

Analyse:

0,1204 g Subst. ergaben 0,1332 g BaSO₄.

Berechnet: Gefunden:



S = 15,26 %

S = 15,19 %.

2-Fluorenäthylsulfoxyd.




Zu einer Lösung des reinen Thioäthyläthers in verdünntem Alkohol gibt man einen Überschuss von 3 % igem Wasserstoffsuperoxyd und erwärmt eine halbe Stunde lang auf dem Wasserbade. Die rötlich gefärbte Lösung giesst man hierauf in viel kaltes Wasser und lässt einige Zeit stehen; die anfangs milchige Flüssigkeit klärt sich, und es scheiden sich lange Nadeln ab, die aus Alkohol umkristallisiert werden. Ihr Schmelzpunkt liegt bei 119,5°.

Analyse:

0,1157 g Subst. ergaben 0,1115 g BaSO₄


Berechnet: Gefunden:



S = 13,24 %

S = 13,23 %.

2-Fluorenäthylsulfon.



Reines Sulfoxyd wird in viel Eisessig gelöst und in der Wärme mit einer 5 % igen Kaliumpermanganatlösung versetzt, bis keine Entfärbung mehr eintritt.

Reaktionsprodukt mit Alkohol und Äther gewaschen und im Trockenschranke bei 100° getrocknet. Aus absolutem Alkohol kristallisiert, erhält man farblose, zu Rosetten vereinigte Nadeln, die bei 175° schmelzen.

Analyse:


0,1125 g Subst. ergaben 0,0888 g BaSO₄.

Berechnet: Gefunden:

(C₂₀H₁₄SO = 302,18)

S = 10,61 % S = 10,83 %.

Oxalyldifluorenylmerkaptan.



Zur Gewinnung dieses Stoffes löst man 2-Fluorenylmerkaptan in absolutem Äther und fügt zu der Auflösung die berechnete Menge Oxalylchlorid, gleichfalls in absolutem Äther gelöst. Man läßt das Gemisch zuerst unter Kühlung mit Eis etwa eine Stunde und dann bei Zimmertemperatur einen Tag stehen. Nach dieser Zeit hat sich ein gelber, fein kristallinischer Niederschlag gebildet, der aus Epichlorhydrin umkristallisiert wird. Das Oxalyldifluorenylmerkaptan bildet gelbe, feine Nadeln, die scharf bei 295° schmelzen.

Analyse:

0,0736 g Subst. ergaben 0,0756 g BaSO₄.

Berechnet: Gefunden:

(C₂₈H₁₈S₂O₂ = 450,28)

S = 14,24 % S = 14,11 %.

Konstitutionsbeweis.

Das Fluoren wurde nach Strassburger¹ mit Salpetersäure vom spez. Gewicht 1,4 in Eisessiglösung

¹ loc. cit.

nitriert und das kristallinische Nitroprodukt in der von Diels¹ beschriebenen Weise mit Zinkstaub in alkoholischer Lösung reduziert. Diese Reduktionsmethode verdient wegen ihrer Einfachheit und guten Ausbeute vor der von Strassburger unbedingt den Vorzug. Ich erhielt ein in farblosen Nadeln kristallisierendes Amin, das scharf bei 131° schmolz. Strassburger gibt 123—124°, Diels 129—130° an.

Das Amin wurde mit verdünnter Schwefelsäure gut zerrieben und mit einem Überschuss derselben eine halbe Stunde lang auf freier Flamme zum Sieden erhitzt. Beim Abkühlen schied sich fast das gesamte schwefelsaure Salz kristallinisch aus. Nach dem Erkalten wurde mit Natriumnitrit in der üblichen Weise diazotiert und die eiskalte, gelbbraun gefärbte Diazolösung in eine gut gekühlte, mit schwefliger Säure gesättigte Suspension einer nach dem Verfahren von Gattermann² frisch dargestellten Kupferpaste in Wasser eingegossen. Während des Eingießens, das nicht zu schnell geschehen darf, wurde mit dem Einleiten der schwefligen Säure fortgefahren und durch kräftiges Rühren ein Absitzen der Kupferpaste verhindert. Nach vier Stunden wurde abfiltriert, wobei die in dem Kupferschlamm befindlichen Kristalle der Sulfinsäure deutlich sichtbar wurden. Der auf dem Filter befindliche Rückstand wurde hierauf mit verdünnter Sodalösung erwärmt, die Flüssigkeit abfiltriert und angesäuert, wobei sich die Sulfinsäure in kristallinischer Form abschied. Nach dem Umkristallisieren aus verdünntem Alkohol erhält man eine Sulfinsäure, die in Blättchen kristallisiert und bei etwa 158° unter Zersetzung schmilzt. Der Schmelzpunkt der nach Knoevenagel dargestellten Sulfinsäure lag bei etwa 155°. Die beiden Stoffe waren also identisch.

¹ loc. cit.

² B. 23, 1218.

Zur Kenntniss des Acenaphtens.

Theoretischer Teil.

Nachdem die 4-Acenaphtensulfinsäure und das 4-Acenaphtenmerkaptan mit Erfolg untersucht und durch zahlreiche Abkömmlinge gekennzeichnet worden waren ¹, fiel mir die Aufgabe zu, weitere Schwefelverbindungen des Acenaphtens herzustellen, bei welchen der Schwefel ebenfalls am Kern, aber an anderer als der p-Stellung zu der CH₂-Gruppe haften sollte.


Ich wollte zunächst versuchen, die 3-Sulfinsäure oder kernsubstituierte Derivate derselben dadurch zu gewinnen, dass ich das von Graebe ² erstmals dargestellte 4-Bromacenaphten dem von Knoevenagel ausgearbeiteten Verfahren zur Darstellung von Sulfinsäuren unterwarf. Dieser Forscher hatte nämlich festgestellt, dass die Halogenkohlenwasserstoffe sich gegen schweflige Säure und Aluminiumchlorid in gleicher Weise wie die reinen Kohlenwasserstoffe verhielten.

Um grössere Mengen des 4-Acenaphtylbromids zu erhalten, musste ich das durch Bromieren in Chloroformlösung stets nur in Schmieren gewonnene Rohprodukt einer Destillation im Vakuum unterwerfen. Hierzu verwendete ich einen von Lenhard verbesserten Fraktionierkolben, der mir gute Dienste leistete (Figur 2).

¹ Klauss, Dissertation Freiburg 1910.

² A. 327, 80.

Obwohl ich genau nach Vorschrift Knoevenagels und unter mannigfach abgeänderten Versuchsbedingungen Bromacenaphten mit SO_2 -Gas in Gegenwart von Aluminiumchlorid in Reaktion brachte, gelang es mir nicht, den Versuch über das erste Stadium der Reaktion, die Bildung des Aluminiumdoppelsalzes, hinauszuführen. Dieses intensiv ziegelrote Produkt erwies eine erstaunliche Beständigkeit gegen fast alle gebräuchlichen Reagenzien. Siedende konzentrierte Natronlauge, ja selbst konzentrierte Schwefelsäure vermochten eine Aufspaltung nicht zu bewirken. Auf dem Platinblech verkohlte



die Substanz und hinterliess einen glühbeständigen, anorganischen Rückstand, der als Tonerde identifiziert wurde. Ohne Zweifel hatte ich das Aluminiumchloriddoppelsalz der Bromacenaphtensulfinsäure in Händen. Da alle Versuche, eine Spaltung des Stoffes zu vollziehen und die gewünschte 4-Brom-3-Sulfinsäure zu gewinnen, versagten, gab ich die in dieser Richtung hin unternommenen Versuche endgültig auf.

Ich hatte nun die Absicht, mir nach der Fittigschen Synthese aus Bromacenaphten und Jodmethyl das 4-Methylacenaphten herzustellen. Von diesem Stoffe

ausgehend, wollte ich nach Knoevenagels Synthese zur 4-Methylacenaphten-3-Sulfinsäure gelangen. Allein auch in diesem Falle stiess ich auf unüberwindliche Schwierigkeiten. Alle Versuche, nach Fittig zum Methyl- oder Äthylacenaphten zu gelangen, versagten, und ich erhielt stets das reine Ausgangsmaterial zurück.

Da ich über eine grössere Menge reinen 4-Bromacenaphtens verfügte, habe ich die von Klauss¹ schon vergeblich angestellten Versuche, nach der Reaktion von Grignard Magnesium auf das 4-Bromacenaphten zur Einwirkung zu bringen, erneut aufgenommen und, ohne Erfolg erzielt zu haben, wieder verlassen. Ich bemühte mich nun, die gleichen Versuche an dem von Sachs und Mosebach erstmals dargestellten 4-Jodacenaphten² anzustellen.

Da die nach der Methode dieser beiden Forscher nach der Sandmeyerschen Reaktion aus der Amido-Verbindung gewonnene Jodverbindung schwer zugänglich, und hierzu eine grosse Menge reinen, nur in zeitraubender Arbeit zu gewinnenden Amidoacenaphtens erforderlich ist, habe ich zahlreiche Versuche unternommen, nach der Methode von Edinger³ mit Jodschwefel und Salpetersäure auf andere Weise zu dem gewünschten 4-Jodacenaphten zu gelangen. Auch hier blieb mein Mühen ohne Erfolg.

Ich kehrte daraufhin wieder zu den Versuchen zur Darstellung kerngeschwefelter Acenaphtenabkömmlinge zurück und wandte mich einer von Gattermann ausgearbeiteten Synthese von Thioaniliden⁴, dem Analogon zu der von Leuckart⁵ für die Gewinnung von Aniliden der Carbonsäuren gefundenen Methode, zu. Die Reaktion

¹ loc. cit.


² B. 43, 2473.

³ B. 33, 2875.


⁴ J. pr. Ch. 59, 572.

⁵ B. 18, 873, 2638.


verläuft in zwei Phasen. Lässt man nämlich auf Senföle Salzsäure einwirken, so lagert sich zunächst ein Molekül dieser Säure an das Senföl an unter Bildung eines unbeständigen Chlorides einer substituierten Thio-carbaminsäure:



Dieses Additionsprodukt reagiert nun in der zweiten Phase mit Kohlenwasserstoffen unter Abspaltung von Salzsäure und Bildung des Thioanilides:



Diese Thioanilide lassen sich leicht durch Oxydation mit Ferricyankalium unter Ringschliessung in Thiazole überführen. Hierbei tritt ein dem Sauerstoff des Oxydationsmittels entstammendes Sauerstoffatom mit dem an den Stickstoff gebundenen und dem in o-Stellung mit ihm am gleichen Ring haftenden Wasserstoffatom als Wasser aus unter Verlagerung der doppelten Bindung und Ringschliessung.



wasserstoff einwirken. Die gewünschte Reaktion trat ein, und ich erhielt in befriedigender Ausbeute ein Acenaphtylthioanilid von grosser Reinheit und in gut kristallisiertem Zustande. Auch die Oxydation zum Thiazol gelang in alkalischer Lösung mit Ferricyankalium, wenn auch die Ausbeute hierbei zu wünschen übrig liess.

Bei der Aufspaltung des Thioanilides vermochte ich die Acenaphtencarbonsäure zu isolieren, die sich mit der von Gattermann¹ mittels Harnstoffchlorid dargestellten 4-Acenaphtencarbonsäure identisch erwies. Hiermit war zugleich der Beweis erbracht, dass das Senföl in die 4-Stellung des Acenaphtens eingetreten war.

Ich versuchte nun dazu überzugehen, an Stelle des Phenylsenföls das Acenaphtylsenföl auf den Kohlenwasserstoff zur Einwirkung zu bringen. Meine nächste Aufgabe bestand darin, grössere Mengen dieses Stoffes zu gewinnen.

Das Acenaphtylsenföl ist erstmals von Quincke² dargestellt und in der Literatur kurz, ohne genauere Bezeichnung des Verfahrens, beschrieben worden. Zu seiner Beschaffung war es erforderlich, über grössere Mengen 4-Amidoacenaphten verfügen zu können. Ich habe nun zahlreiche verschiedentlich abgeänderte Verfahren durchprobiert und erhielt auch ein reines Material, jedoch nicht in guter Ausbeute.

Da mir einerseits grössere Mengen Amin nicht zur Verfügung standen und andererseits die Herstellung genügender Quantitäten Senföl sehr zeitraubend geworden wäre, musste ich den Versuch, das o-Amidoacenaphtenmerkaptan auf diesem Wege zu gewinnen, aufgeben. Eine andere Methode, die mich in den Besitz des o-Amidomerkaptans hätte führen können, war die von Jacobson und Ney³. Aber auch für diese Reaktion

¹ Annal. 244, 58, ² B. 21, 1457. ³ B. 22, 904.

sind grössere Quantitäten Amidoacenaphten als Ausgangsmaterial erforderlich, die ich nur mühsam hätte gewinnen können.

Die beiden Forscher hatten durch Schmelzen von aromatischen Monoacetylaminen mit Schwefelphosphor Thioacetylverbindungen dargestellt und diese durch Oxidation in die entsprechenden Thiazole übergeführt. Aus diesen lassen sich ebenfalls wie bei der zuerst angeführten Methode durch Aufspalten des Thiazolringes o-Amidomerkaptane gewinnen.


Durch Einwirkung von Oxalylchlorid auf das mir noch zur Verfügung stehende 4-Amidoacenaphten erhielt ich, wie die Molekulargewichtsbestimmung zeigte, ein Oxalyldiacenaphtylamin. Ein Molekül Oxalylchlorid hatte also mit zwei Molekülen Amin unter Abspaltung von zwei Molekülen Salzsäure reagiert.

Tabellarische Übersicht über die aus Acenaphten gewonnenen Stoffe.

1.	4-Acenaphtylthioanilid	F. P. 148°
2.	Acenaphtylphenylthiazol	F. P. 140°
3.	4-Acenaphtylsenföl	F. P. 99°
4.	Monoacetylamidoacenaphten	F. P. 188°
5.	Oxalyldiacenaphtylamin	F. P. 292°.

Experimenteller Teil.

4-Acenaphtylthioanilid.




Zu einer Lösung von 20 g Acenaphten in möglichst wenig Schwefelkohlenstoff gibt man 10 g Phenylsenföl und 20 g fein gepulvertes Aluminiumchlorid und erwärmt die Mischung unter häufigem Umschütteln etwa zwei Stunden lang auf dem Wasserbade am Rückflusskühler. Das Reaktionsprodukt wird auf Eis gebracht und mit demselben möglichst innig zerrieben. Nach dem Abtreiben des Schwefelkohlenstoffs und des unverbrauchten Senföls mit Wasserdampf bleibt eine zusammenhängende, spröde, grünlich gefärbte Masse zurück, die fein gepulvert und dann in Alkohol gelöst wird. Durch mehrmaliges Umkristallisieren aus Alkohol oder Eisessig unter Zusatz von Tierkohle erhält man ein reines, kristallinisches Produkt, das aus gelben, zu Rosetten vereinigten Nadeln besteht und konstant bei 148° schmilzt. Es ist löslich in allen organischen Lösungsmitteln, mit Ausnahme von Ligroin. In konzentrierter Schwefelsäure löst es sich mit grüngelber Farbe. Die Ausbeute betrug 22 g, also 59% der Theorie.

Analýse:

1. 0,1786 g Subst. ergaben 0,1446 g BaSO₄
2. 0,1615 g Subst. ergaben 0,1324 g BaSO₄.

Berechnet:

Gefunden:



S = 11,08 %


S = 11,12 %

S = 11,26 %.

Spaltung des 4-Acenaphthylthioanilides.

Etwa 2 g des Acenaphthylthioanilides wurden mit verdünnter wässriger Sodalösung im Bombenrohr fünf Stunden lang auf 170—180° erhitzt. Nach dem Filtrieren des Rohrinhaltes wurde das Filtrat angesäuert und der entstehende Niederschlag abfiltriert. Das so gewonnene Produkt zeigte deutlich saure Eigenschaften und erwies sich auch durch seinen Schmelzpunkt 212° als identisch mit der von Gattermann dargestellten Acenaphten-4-Carbonsäure.

Acenaphthylphenylthiazol.




Eine Lösung von 5 g Acenaphtylthioanilid in 100 ccm 10% igem alkoholischem Ätznatron wird langsam unter Umrühren in 100 ccm heisse, 20% ige Ferri-
cyankaliumlösung eingegossen. Man dampft etwas ein und lässt erkalten. Hierbei werden braune Nadeln, die noch stark mit Ferrocyan-
kalium verunreinigt sind, erhalten. Nach dem Abfiltrieren wird sorgfältig mit heissem Wasser nachgewaschen, gut getrocknet und mehrmals aus Äther unter Zusatz von wenig Tierkohle umkristallisiert. Lässt man die ätherische Lösung ohne umzuschütteln langsam verdunsten, so erhält man sehr gut ausgebildete, grosse, braune Kristalle von lanzettförmiger Gestalt, die bei 140° schmelzen. Die Substanz ist in allen Lösungsmitteln leicht löslich, mit Ausnahme von Ligroin. In konzentrierter Schwefelsäure löst sie sich mit prächtig grüner Fluorescenz, die allmählich in Hellblau übergeht.

Analyse:

1. 0,1547 g Subst. ergaben 0,1240 g BaSO_4
2. 0,1582 g Subst. ergaben 0,1296 g BaSO_4 .

Berechnet:

Gefunden:




S = 11,16 %

S = 11,01 %

S = 11,25 %.

4-Acenaphtylsenfö. .



N : C : S .

5 g 4-Amidoacenaphten wurden mit 200 ccm Schwefelkohlenstoff und 40 ccm 10% igem alkoholischem Kali

40 Stunden lang zum Sieden erhitzt. Nach dem Abfiltrieren und Eindampfen wurde der braun gefärbte Rückstand aus verdünntem Alkohol unter Zusatz von Tierkohle umkristallisiert. Auf diese Weise wurden bräunlich gefärbte Kristalle erhalten, die bei 99° schmolzen. Quincke gibt für diesen Stoff den Schmelzpunkt 96° an.

Analyse des Senföls.

0,1476 g Subst. ergaben 0,1591 g BaSO_4 .

Berechnet:


Gefunden:

$(\text{C}_{13}\text{H}_9\text{NS} = 211,15)$

S = 15,18%

S = 14,80%.

Monoacetylamidoacenaphthen.



Zur Darstellung des Monoacetylderivates wird das trockene Amin mit etwa der doppelten Gewichtsmenge an Acetylchlorid eine halbe Stunde am Rückflusskühler auf dem Wasserbade erhitzt. Das abgeschiedene Reaktionsprodukt wird darauf filtriert und auf dem Filter mit heissem Wasser ausgewaschen. Das öfter aus Alkohol umkristallisierte Produkt schmolz bei 188° . Quincke gab für diesen Stoff den Schmelzpunkt 176° an.

Nach Abschluss dieser Arbeit erschien eine Abhandlung von Sachs und Mosebach¹, welche diesen Stoff ebenfalls hergestellt und einmal, bei besonders reinem Material, den Schmelzpunkt 192° beobachtet haben.

¹ B. 44, 2852.

Analyse:

0,1894 g Subst. ergaben 11,6 ccm Stickstoff.

(t = 25,5° b = 741 mm)

Berechnet:


Gefunden:

(C₁₄H₁₃NO = 211,11)

N = 6,63%

N = 6,66%.

Oxalyldiacenaphtylamin.



4 g 4-Amidoacenaphten werden in absolutem Äther gelöst und langsam mit einer Auflösung von 1,5 g Oxalylchlorid in 20 ccm wasserfreiem Äther versetzt. Die Reaktion, die schon in der Kälte vor sich geht, wird durch Erhitzen auf dem Wasserbade beendet. Man filtriert ab und kristallisiert wiederholt aus Pyridin unter Zusatz von wenig Tierkohle, um. Es werden so lange, spitze Nadeln erhalten, die schwach gelblich gefärbt sind und bei 292° schmelzen. Sie sind löslich in Tetrachloräthan, Chloroform, Pyridin, Epichlorhydrin, Nitrobenzol, Xylol, Toluol und Benzol; unlöslich in Alkohol, Äther, Ligroin und Aceton.

Analyse:

1. 0,1741 g Subst. ergaben 11,65 ccm Stickstoff

(t = 21° b = 747 mm).

2. 0,1601 g Subst. ergaben 10,70 ccm Stickstoff

(t = 23° b = 748 mm).

Berechnet:

Gefunden:

(C₂₆H₂₀N₂O₂ = 392,18)

N = 7,16%

1. N = 7,44%

2. N = 7,37%.

Molekulargewichtsbestimmung.

Als Lösungsmittel wurden je 20 g Resorcin ($k = 65$), als Heizbad Naphtalin verwendet.

1. 0,1866 g Subst. ergaben eine Depression von $0,19^\circ$.
2. 0,1818 g Subst. ergaben eine Depression von $0,16^\circ$.

Berechnet:

$$M = 392$$

Gefunden:

1. $M = 319$

2. $M = 369$.

Vorstehende Untersuchungen wurden im chemischen Universitätslaboratorium (Abteilung der naturwissenschaftlich-mathematischen Fakultät) zu Freiburg i. Br. ausgeführt.

Herrn Privatdozent Dr. Lenhard spreche ich für die Anregung zu dieser Arbeit, seine wertvolle Hilfe und sein grosses Entgegenkommen meinen herzlichsten Dank aus.